

### FICHES ESPECES BIOLIT


### **Nouveaux arrivants**



est un programme de



# CLASSEUR DES FICHES ESPECES BIOLIT - ATLANTIQUE, MANCHE, MER DU NORD -







la trouver ?

Sur les fonds rocheux dans la zone de balancement des marées, jusqu'à 5m de profondeur. Elle se développe en eaux calmes (ports ou estuaires) sur toute

sorte de substrat solide (naturels ou

artificiels).

Toute l'année.

### Balane croix de Malte - Austrominius modestes


**CRUSTACES** 



Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Très fréquente	Invasive	Non protégée	Sur les côtes

### Comment la reconnaître ?

Aspect croix de Malte vu de dessus 4 plaques équivalentes extérieures Ouverture losangique



Taille: 10 mm maximum

Couleur: Les jeunes individus sont blanc bleuté et les individus matures sont grisâtres

Ne pas confondre avec Semibalanus balanoides qui est plus grande (plus de 15cm) et qui possède 6 plaques au lieu de 4

### BioLit est un programme porté par

planète.

Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

### Voyageuse en temps de guerre

Originaire de Nouvelle-Zélande et d'Australie, elle a été observée en Europe, pour la première fois en 1945 au niveau de la Grande Bretagne puis sur les côtes belges. Elle aurait été introduite plusieurs fois par les navires de guerres. On la retrouve aujourd'hui des côtes portugaises aux côtes danoises ainsi qu'en Méditerranée occidentale.

### Statutet menaces

Cette espèce est classée au statut d'espèce invasive et envahissante par sa grande tolérance aux conditions environnementales variées et sa prolifération rapide. Elle peut remplacer les espèces indigènes d'une zone en s'installant à leur place. De plus, la balane croix de Malte peut gêner les autres coquillages d'intérêt commercial tels que les huîtres et les moules en s'installant dessus.



La colonisation par cette espèce s'est faite très rapidement. En effet, elle présente une large gamme de tolérance en termes de salinité et de température.

Votre observation complètera la carte de répartition de cette espèce invasive.

### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr



Il peut s'attaquer aux espèces prises dans les filets, et les abimer. Ici, on voit bien ses pattes natatoires palmées.

On le trouver ?
On le trouve rarement sur les côtes atlantiques. Le crabe bleu est capable de supporter d'importantes variations de salinité et se retrouve souvent dans les zones d'estuaires, fleuves mais aussi dans la zone intertidale jusqu'à 90m.

### Quantie trouver?

Toute l'année

### Pourquoi nous intéresse-t-il ?

La première observation sur la côte atlantique française date de 1901. Depuis quelques signalements ont été réalisés sur la façade orientale de la Manche. Aucun signe de reproduction n'avait été repéré avant 2019 sur la côte méditerranéenne ou depuis les populations se développent rapidement. Tout signalement permettra de mettre à jour la carte de répartition de l'espèce.

### Crabe bleu américain - Callinectes sapidus

CRUSTACES

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Très rare	Potentiellement invasive	Non protégée	Estuaire, fleuve, estran

### Commente reconnaître ?

La couleur bleue de ses pinces, achevées par une fine zone rouge chez les femelles ainsi que la taille de sa carapace (deux fois plus large que longue) sont caractéristiques. Sa carapace est d'une couleur comprise entre le gris et le marron. Ayant des caractéristiques particulières, il y a peu de risque de confusion, cependant *Portunus segnis* qui n'est pas loin de nos côtes lui ressemble beaucoup.

# Pinces et pattes bleues Carapace deux fois plus large que longue, pointue aux extrémités. \* THOMAS (SUATEMALA) @dictarcom/photos/thomas\_schitel

### **Comment**

Les femelles crabes ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie, pour cela elles migrent dans une zone d'eau salée où elle vont pondre leurs œufs en très grand nombre. Les larves se développent dans les zones salées, les individus adultes remontent par la suite dans les zones d'estuaire ou plus généralement dans des eaux saumâtres Le crabe bleu américain peut avoir des comportements cannibales.

### Une solution

Le crabe bleu d'Amérique est consommable par l'homme, il peut donc aussi représenter une ressource de pêche. Aux Etats-Unis lorsque sa carapace est molle après sa mue, il est consommé entier dans des sandwiches ou des beignets.

### STATU menaces

Le crabe bleu est un prédateur vorace et féroce, il peut consommer des coquillages (jusqu'à 600 palourdes par jour), des espèces benthiques et s'attaquer aux poissons prisonniers d'engins de pêche et causer des dégâts sur ces mêmes engins. C'est aussi un compétiteur potentiel d'autres espèces de crabes. De plus, c'est un nageur très performant capable de parcourir 15 km par jour. Ces caractéristiques biologiques ainsi que les changements environnementaux favorables actuels, font du crabe nageur une espèce à fort potentiel invasif sur les côtes françaises.

Taille de la carapace : 20 cm de large, 9 cm de long



### www.biolit.fr

### Caprelle japonaise - Caprella mutica

### **CRUSTACES**





### la trouver ?

Dans les eaux des mers côtières peu profondes et riches en éléments organiques ainsi que dans les estuaires. Elle est capable de coloniser tout type de milieu même s'ils sont pollués.

Toute l'année.


En France, cette espèce a été retrouvée dans la baie de Seine et dans le port du Havre. En 2012, on la retrouve dans la péninsule ibérique en Galice. Il n'y a pour l'instant aucune observation de cette espèce en mer Baltique et en mer Méditerranée. est une espèce agressive qui pourrait supplanter et entrer en compétition avec les espèces natives pour l'habitat ou la nourriture. Votre observation complètera la carte de répartition de cette espèce invasive.

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Peu fréquent	Invasive	Non protégée	Sur les côtes


### **Comment** la reconnaître ?

Appendices avec 2 antennes robustes

> Petites épines sur le corps



Thorax divisé en 7 segments avec l'abdomen qui prolonge le 1er



Cette espèce étant très petite, sans loupe binoculaire, elle peut être confondue avec toute autre caprelle comme Caprella linearis.

Sans loupe, seuls les gros mâles de C. mutica peuvent se BioLit est un programme porté par différencier des mâles de C. linearis, qui atteignent une taille maximale inférieure (22 mm).



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)



### Adaptation

Elle présente une forte tolérance vis-à-vis des contraintes environnementales et peut survivre dans une grande diversité de milieux. Elle croît rapidement et présente un taux de reproduction élevé (entre 15 et 363 œufs fécondés par femelle). Son caractère flexible et son adaptation aux activités anthropiques font d'elles d'excellentes envahisseuses. De plus, la diversité dans le mode de nutrition (broutage, filtrage, nécrophagie, détritivorisme) leur permet de s'adapter facilement.

### Introducți

L'introduction est inconnue mais il est probable que le transport des organismes pour l'aquaculture et le transport maritime (eaux de ballast, fouling) soient en cause. On la retrouve actuellement sur les côtes du Pacifique, de l'Amérique du Nord, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Belgique et de l'Angleterre.





Zoom sur les dents antéro-latérales.

### le trouver ?

Dans les zones estuariennes.

### Quante trouver?

Le jour, il se tient dans des terriers creusés dans les berges, et sort la nuit. De juillet à octobre, on peut le retrouver en mer pendant la période de reproduction. Les jeunes remontent les fleuves au printemps.

### Pourquoi nous intéresse-t-il?

Le crabe chinois est originaire d'extrêmeorient (Chine et environs) et a été introduit dans plusieurs pays d'Europe. Sa tolérance aux conditions environnementales en font une remarquable espèce invasive.

Votre observation permettra de suivre sa répartition.

### Crabe chinois à mitaines - Eriocheir sinensis



Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Introduite	Invasive	Sur les côtes

### Commente reconnaître ?

CC BYNC SA

### Bout des pinces blanc

4 dents antéro-latérales

Pattes légèrement poilues



Couleur : brun / brun clair Taille maximale : 9 cm

### Des mitaines ?

Les pinces du mâle sont couvertes d'un manchon de poils, ce qui justifie son nom de "crabe à mitaines"

### Incidences gestion

Il perturbe le fonctionnement des écosystèmes et entre en compétition avec certaines espèces locales, comme le crabe vert. On le retrouve dans les nasses à anguilles, et dans les chaluts à crevettes, occasionnant des dégâts dans les filets des pêcheurs. Il détériore et fragilise les berges des cours d'eau et crée une forte érosion en creusant des galeries de plus de 80cm de profondeur.

### Un crabevégétarien ?

Le crabe chinois est végétarien au début de sa vie, puis devient prédateur en grandissant. Il apprécie particulièrement les mollusques bivalves et gastéropodes, les crustacés, les vers et les larves d'insectes.

### **Consommation**

Menacée par la surpêche dans son aire d'origine, la consommation de cette espèce n'est pas sans risque. En effet, le crabe chinois à mitaine peut véhiculer une parasitose et d'autres bactéries pouvant causer des dérèglements digestifs chez l'homme.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### **ATLANTIOUE**



### Crabe sanguin - Hemigrapsus sanguineus



♥ Stephane Le Granche (aoris,Tressm.fr)	
ris.∏essm.fr	4. 高 700 (1)
ranche (ao	
epnane Le C	
20	

Sa couleur marbrée est un bon camouflage qui le rend souvent difficile à distinguer sur les rochers.

### Statut Rencontre Espèce Lieu de vie Introduite Commune Non protégée Sur les côtes

### Commente reconnaître ?

Front large = la moitié de la largeur de la carapace



**Bandes** claires et sombres sur les pattes marcheuses

### le trouver ?

Surtout dans la zone de balancement des marées. Il préfère les côtes rocheuses, exposées aux vagues, mais vit parfois sur les fonds de sable et petits graviers.

3 épines de

chaque côté

de la carapace

Toute l'année.

### nous intéresse-t-il ?

On cherche à déterminer l'aire de répartition de cette nouvelle espèce observée sur les côtes françaises de la Manche, et à déterminer la densité de son peuplement.





Les mâles ont vésicule entre les doiats des pinces

Bord interne de la pince très dentelé

Carapace presque carrée Couleur : brun orangé à vert Largeur max carapace: 5 cm redresse ses pinces, on vésicule typique de l'espèce

Lorsaue le



Il préfère les côtes exposées aux vagues et se rassemble en grand nombre sous les roches. C'est un omnivore : il chasse les petits invertébrés, s'attaque aux coquillages (huîtres, moules, ...) et complète son menu avec des restes d'animaux et d'algues. La femelle pond plusieurs fois par an, chaque ponte libérant des dizaines de milliers de larves qui se dispersent, emportées par les courants, et colonisent de nouveaux rivages.

Le crabe sanguin préfère les eaux tempérées froides, mais semble supporter une large gamme de températures et de salinités. Cette tolérance aux facteurs du milieu, alliée à une forte fécondité et à un régime alimentaire très opportuniste. sont autant d'atouts qui lui permettent de s'installer sans difficulté sur de nouvelles côtes.

### menaces

vient du Pacifique no.

de ballast des cargos. Il a été observe.

Havre en 1999. On l'observe maintenant tout le

Manche, du Cotentin à la frontière belge, et jusqu'en mer du

Nord, avec des densités croissantes. Il semble entrer en

compétition avec le crabe vert d'Atlantique (voir fiche).

BioLit est un programme porté par



relais partenaires

(Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

### www.biolit.fr

### Crabe à pinceaux de Takano - Hemigrapsus taka



noi	
USTACES	(P)

	***************************************	
F		
	ACE.	
10		The second second
		Sales Control


Ce crabe japonais cherche l'abri d'une fissure dans le port de Dunkerque (59).

Rencontre Espèce Statut Lieu de vie Commune Introduite Non protégée Sur les côtes

### le reconnaître ?

Carapace de forme presque carrée

Touffe de poils à l'extrémité de la pince du mâle (voir aussi photo de droite)



Petit crabe Couleur sombre : grisâtre, verdâtre, brunâtre Largeur max carapace = 3 cm

### le trouver ?

Yves Müller (doris.ffessm.fr)

3 dents de chaque côté de la carapace

Sur l'estran des zones vaseuses, dans la zone de balancement des marées. Parfois un peu plus bas, dans la zone qui ne découvre jamais.

Principalement à la belle saison.

### nous interesse-t-il ?

Comme son cousin, le crabe sanguin, il est arrivé très récemment (moins de 20 ans). Il a tendance à coloniser très rapidement les rivages européens. On cherche à déterminer son abondance et à savoir dans quelle mesure il entre en compétition avec les crabes de nos côtes.

### À ne pas confondre avec...

Le crabe sanguin ( Hemigrapsus sanguineus - voir fiche) lui ressemble beaucoup, bien que légèrement plus grand. La différence se trouve au niveau de la pince : le crabe sanguin mâle (A) présente une vésicule entre les doigts de la pince alors que le crabe japonais mâle (B) porte une touffe de poils caractéristique.



**Pattes** 

rayées

marcheuses

de bandes

sombres

BioLit est un programme porté par

grâce à des structures planète relais partenaires

Merci à tous nos relecteurs Il est animé localement pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

Sur ce mâle vu de face, on voit bien la touffe de poils couleur crème entre les doigts des



© Daan Delbare (wikicommons)

Originaire du Pacifique nord-ouest, le crabe Japonais a été vu pour la première fois à La Rochelle, en 1994. 20 ans plus tard, il est présent dans tout le golfe de Gascogne, depuis l'Espagne jusqu'à Lorient, et le long de la Manche. Curieusement on ne le trouve pas sur les côtes anglaises. Il préfère les rivages calmes et les fonds de vase meuble. Très opportuniste, il se nourrit aussi bien de petits invertébrés et de coquillages que de débris organiques.

La femelle peut pondre jusqu'à 50 000 œufs, 3 à 4 fois par saison, ce qui rend cette espèce extrêmement prolifique et explique la rapidité de son expansion sur notre littoral.

Après avoir conquis la rive américaine de l'Atlantique, à la fin des années 1980, le crabe japonais est aujourd'hui bien implanté en Europe, de l'Espagne jusqu'à l'Allemagne. Il y occupe les mêmes zones du rivage que certains crabes

natifs de nos côtes et se nourrit des mêmes proies. Il entre donc en compétition avec eux, notamment avec le crabe vert d'Atlantique (voir fiche)



### Crépidule - Crepidula fornicata ou pantoufle de mer

MOLLUSQUES







Les crépidules forment souvent des chaînes de 10 à 20 individus.

### la trouver ?

Sur le rivage : dans la laisse de mer. Les crépidules vivantes restent empilées. Les coquillages morts sont dispersés. Sous l'eau : elle se fixe sur les rochers ou sur d'autres animaux, depuis la zone des fucus iusqu'à 20 m environ.

## **la trouver ?**

### nous intéresse-t-elle ?

Originaire des côtes américaines, elle a été introduite en Europe avec des huîtres au XIXème siècle. D'abord en Angleterre, puis en Manche et en Bretagne où elle est très abondante : elle occupe ainsi 1/4 de la Baie de Saint Brieux! Son impact sur le milieu est considérable.

Statut Lieu de vie Rencontre Espèce Introduite Commune Non protégée Sur les côtes

### **Comment** reconnaître ?



Une lame intérieure blanche ferme à demi l'ouverture

Coquille peu spiralée en forme de bonnet phrygien



Couleur : blanche rosée ou jaunâtre Taille: 5 cm de long (max 10 cm)

### **Eradiquer ou valoriser ?**

Devant l'impossibilité de contenir l'invasion de la crépidule, on cherche maintenant à l'exploiter. De la restauration (qui crée de nouvelles recettes) à la fabrication de papier peint et à l'amendement calcaire pour les terres agricoles, les idées sont nombreuses!





### en communauté

Les crépidules vivent à faible profondeur, près des côtes. Elles se fixent les unes les autres, grâce à leur pied qui fait ventouse, et forment des chaînes comptant jusqu'à 20 individus. Les femelles occupent la base tandis que les mâles sont au sommet. Une stratégie de reproduction très efficace (fécondation directe et protection des œufs) leur permet une colonisation rapide. D'autant plus qu'elles résistent aux grandes variations de température et de salinité qui sont mortelles pour d'autres espèces.

### **Transexual**

Les crépidules changent de sexe au cours de leur vie : elles sont d'abord mâles, puis femelles! Mieux, elles peuvent changer de sexe selon les évènements : lorsqu'un jeune mâle se fixe sur un autre, celui de dessous devient femelle. De même, lorsque l'empilement de plusieurs crépidules est détruit, et que les mâles qui étaient au sommet de la pile se retrouvent à la base, alors ils deviennent femelles.

Sa prolifération bouleverse le milieu : elle fait disparaître les 

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### **ATLANTIOUE**





La couleur et la forme varie en fonction des individus.

### la trouver ?

L'huitre creuse vit depuis la surface jusqu'à 80 m de profondeur, plutôt le long des côtes abritées, dans la zone des marées, même dans des eaux peu salées. Elle se fixe sur les substrats durs (roche, poteaux, quais).

Toute l'année, en toutes saisons.

### nous intéresse-t-elle ?

Quand les bonnes conditions sont réunies, elle peut former de véritables récifs, ce qui entraine une modification de la communauté benthique. Vos observations permettront de suivre la progression de cette espèce sur la façade Atlantique.

### Huître creuse - Magallana gigas

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Invasive	Non protégée	Sur les côtes

### Commenta reconnaître ?


Mauve ou

verdâtre

Stries de croissances

marquées

Une valve plate





La taille varie en fonction de l'âge, mais la forme reste allongée et ovale.

### Crassostrea gigas ou Magallana gigas?

Les deux noms correspondent à la même espèce, car la distance génétique entre ces 2 types d'huîtres est trop faible pour justifier leur BioLit est un programme porté par séparation en tant qu'espèces distinctes. Aujourd'hui seul Magallana gigas est valide.



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)





### Incidences

L'huître creuse représente la première production conchylicole française, et une des espèce de coquillage les plus cultivées à l'échelle mondiale en aquaculture. Elle représente donc une économie locale importante.

Le développement de massifs d'huitres et la colonisation de substrats rocheux ou meubles (parce qu'il suffit d'un gros caillou) modifient les processus sédimentaires et peuvent induire une compétition trophique avec les autres animaux filtreurs. La gestion de cette huitre nécessite des programmes d'entretien du littoral très couteux.

Une valve creuse

Originaire du Pacifique Nord-Ouest, elle a fait l'objet d'introductions volontaires aux guatre coins du monde. Introduite en Europe à la fin des années 60, elle a été importée massivement en France au début des années 70 pour remplacer l'huître creuse portugaise.





Lorsqu'on le sort de son substrat, il referme

directement son opercule. Ici on peut voir le muscle

### le trouver ?

en train de se refermer.

On peut le trouver dès les petits fonds, enfoui dans les substrats meubles, ne laissant dépasser du sédiment que le bout de son siphon, et sur le rivage quand il se trouve rejeté par les vagues.

### Quandle trouver ?

Toute l'année, notamment la nuit (période de prédation).

### POUTOUO nous intéresse-t-il ?

Originaire d'Asie, on cherche à suivre la progression de cette espèce sur la façade Atlantique.

Vos observations sont précieuses pour le suivi de l'évolution et de la répartition de cette espèce.


### Rapane veiné - Rapana venosa

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Occasionnelle	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

### Commente reconnaître?

Coquille volumineuse, globuleuse et sculpturale en forme de spirale

> Cernes blanches dans le sens de l'enroulement



Grande ouverture


Couleur de l'ouverture : orange foncée à jaunâtre Taille : 18 cm de long pour 10 cm de large

### À ne pas confondre avec...

Des espèces comme le Pourpre bouche de sang (Stramonita haemastosoma)
où la coquille est plus petite (jusqu'à 8 cm) et plus allongée, son
ouverture est moins large et moins haute.

BioLit est un programme porté par

Les gros perceurs commeHexaplex trunculus, souvent confondu par les ostréiculteurs.







Ponte de rapane veiné

### Redoutable

Le rapane, un prédateur nocturne et carnivore, choisit ses proies avant de les étouffer et de sécréter un mucus toxique. Les jeunes, eux ont plutôt tendance à percer les coquilles des mollusques pour s'en nourrir. Ils apprécient notamment les huitres, les moules et les palourdes.

### Statut<sub>et menaces</sub>

D'origine asiatique (mer du Japon, mer de Chine), le rapane veiné a été introduit en mer Méditerranée par le commerce international de coquillages, et par les eaux de ballasts des navires dans différentes parties du monde. Il est également présent en mer du Nord et sur la façade Atlantique, notamment dans les pertuis charentais.

grâce à c relais pa

planète

Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires






### Perceur d'huître atlantique - Urosalpinx cinerea

AVA	6 111		-(( ))		ES
м				W	العربطا

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Invasive	Non protégée	Sur les côtes

### Commente reconnaître ?

**Coquille fusiforme** 



Trou percé par le perceur d'huître pour se nourrir de

### le trouver 2

Ponte du perceur d'huître

Sous l'eau: jusqu'à 15m, sur les fonds rocheux et coquilliers et dans les estuaires Sur le rivage: échoué en dépôt sur la laisse de mer

Toute l'année. Entre le printemps et l'été on peut observer les pontes.

Pour suivre la colonisation de l'espèce et dresser la carte de sa répartition sur le littoral français, notamment dans les zones conchylicoles où elle peut s'attaquer aux bivalves cultivés.

5 tours de spires

Canal siphonal

ouvert



Taille: 20 mm en moyenne (entre 15 et 40 mm) Couleur : blanc grisâtre ou jaunâtre avec des bandes brunes et irrégulières, l'opercule est de couleur orange à marron clair.



Il est capable de percer la coquille des crustacés comme les balanes, ou des mollusques comme les moules et les huîtres grâce à sa radula: sorte de langue râpeuse. Il fabrique une substance qui ramolli la coquille avant d'introduire sa trompe pour manger les tissus de l'animal.

Il est originaire de la côte Atlantique Nord-américaine et a envahi les baies du Pacifique Nord Américain puis les côtes de la Manche et l'Atlantique Nord-Est.

Il a été observé une première fois sur les côtes du Pacifique en 1890 après avoir été introduit avec des expéditions de transfert de l'huître de l'Atlantique (commencées une dizaine d'année plus tôt) ou par d'autres expéditions de transferts de coquillages.

Il s'agit d'une espèce invasive qui a un impact écologique et économique, notamment sur la culture d'huître et de moules. De plus, il s'agit d'une espèce ayant une large gamme de tolérance. Elle possède une variété de proies potentielles qui se trouvent dans une grande aire de répartition. Elle se reproduit très facilement et rapidement, et ses prédateurs sont rares. Toutes ces caractéristiques font qu'elle peut s'implanter facilement, ce qui fait d'elle une espèce envahissante.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires



### Asparagopsis à crochets - Asparagopsis armata Asparagopsis if - Asparagopsis taxiformis

**ALGUES ROUGES** 





Asparagopsis taxiformis sur les côtes des Pyrénées orientales.

### les trouver 2

Sur le rivage : dans les dépôts de la laisse de mer, parfois dans les cuvettes

à marée basse.

En mer : sur les fonds rocheux, à faible profondeur, dans les endroits exposés aux vagues.

En été, on peut trouver des rameaux de ces algues annuelles.

### nous intéresse-t-elle 2

A. taxiformis est une algue subtropicale. très largement répandue dans le monde, que l'on trouve jusque sur nos côtes Atlantiques.

A. armata est originaire de Nouvelle Zélande et Australie. Elle est arrivée sur nos côtes françaises vers 1925. On la trouve aujourd'hui depuis îles Shetland jusqu'aux îles Canaries


On cherche donc à suivre l'installation de ces deux espèces.

Statut Rencontre Espèce Lieu de vie Fréauente Introduites Non protégées Sur les côtes

### Commen reconnaître les Asparagopsis ?

Rameaux terminés par une touffe pyramidale Allure dense du rameau en "asperge"

**Nombreuses** ramifications alternées



Les 2 espèces sont très semblables : Couleur rose clair à rouge (parfois tirant sur le jaune)

Taille du rameau: 15 à 30 cm



Asparagopsis armata a des rameaux portants de petites épines recourbées en harpons (d'où son autre nom: harpon de Neptune). Asparagopsis taxiformis n'en a pas.



Détail de A. armata sous l'eau

Ces petits pompons  $cotonneux (\emptyset = 1)$ à 2 cm), faits de filaments fins. sont les amas de spores de l'Asparagopsis.



© Daniel Buron (doris.ffessm.fr)

### vivent-elles 2

Les Asparagopsis vivent sur les rochers près des côtes, depuis la surface jusque vers 10 m de profondeur. A. armata est souvent accrochée à d'autres algues par ses harpons. Ce sont des algues annuelles dont la forme buissonnante se développe au printemps-été, puis disparaît après la reproduction.

On a longtemps cru que les "buissons" et les "pompons" étaient deux espèces d'algues. Mais, en les faisant pousser en laboratoire, on a constaté qu'il s'agit en réalité des deux formes que l'algue prend au cours de son cycle

La forme "buisson de rameaux" (qui compte des pieds mâles et des pieds femelles) produit les cellules sexuelles. Après fécondation (qui a lieu sur les rameaux), le "buisson" libère des spores qui, en grossissant, forment des pompons roses et sont emportés par les courants. En germant, ces pompons donnent naissance à un nouveau pied d'Asparagopsis.

Ces algues sont invasives. Elles ne sont pas broutées par les herbivores car elles possèdent des toxines dans leurs tissus. Elles se multiplient rapidement sur nos côtes.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires





Massif de codium photographié à marée basse en Atlantique.

### le trouver ?

Sur terre : dans la laisse de mer, il ne reste souvent de l'algue que des fragments desséchés et noircis.

Sous l'eau : en buissons, on le rencontre depuis la surface jusqu'à 10 m de profondeur.

### Quantie trouver ?

Toute l'année.

### POUTCUO I nous intéresse-t-il :

Le Codium fragile est originaire du Pacifique. Il serait arrivé sur les côtes atlantiques vers 1920. Votre observation complètera la carte de répartition de cette espèce invasive.

### Codium fragile - Codium fragile

Rencontre	Espèce	Statut	Plante
Commune	Invasive	Non protégée	Vivace

### Commente reconnaître ?

Algue dichotomique : à chaque ramification, elle se divise en 2 parties égales Rameaux cylindriques, de section constante sur toute leur longueur



Consistance souple et spongieuse

Extrémités arrondies

Couleur : vert foncé à vert bouteille Forme des massifs jusqu'à 50 cm de large Hauteur max = 30 cm



Sous l'eau, le couvert de poils, caractéristique des codium, donne cet aspect feutré qui est à l'origine de leur nom: "codion" signifie "petite toison" en grec.



© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr

### Comment vit-il?

Le codium fragile est une espèce "photophile" (qui aime la lumière). Il vit dans la partie la plus éclairée de la mer, entre la surface et 10 m de profondeur, où il s'accroche par des crampons sur tous les supports : rochers, coquillages, mais aussi quais et digues.

Ce codium tolère toutes les températures et salinités.

De plus, il grandit vite, se multiplie facilement, et semble résistant aux pollutions : il a donc tous les atouts d'une espèce invasive.

### Du Pacifique à l'Antarctique

Il se multiplie essentiellement par bouturage : les fragments arrachés vont se réimplanter plus loin pour former un nouveau massif. Le codium fragile se disperse ainsi rapidement.

Il peut survivre longtemps, lorsqu'il est arraché, ce qui lui permet de voyager loin. Au cours du siècle dernier, il s'est ainsi peu à peu installé dans toutes les régions du monde, et même en Antarctique!

### STATI menaces

Contrairement aux algues laminaires, ces massifs denses procurent peu de refuge à la faune qui a besoin du couvert des algues pour se développer. Le codium est aussi peu colonisé par les animaux qui se fixent normalement sur les algues. Il a enfin un impact économique en envahissant les élevages d'huîtres et moules.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### Grateloupe du Pacifique - Grateloupia turuturu

**ALGUES ROUGES** 





Cette grateloupe très ramifiée est étalée dans le sens du courant. Photographiée près de Lorient (56).

### la trouver ?

Sur l'estran, mais pas partout : elle ne s'installe que dans les cuvettes où l'eau circule en permanence dans les endroits où il subsiste un écoulement d'eau, même à marée basse.

### Quanga trouver ?

Toute l'année. En été, les lames (ou frondes) sont plus développées. En hiver, en revanche, elles dépassent rarement 10 cm.

### Pour nous intéresse-t-elle :

On cherche à suivre la dispersion de cette espèce sur notre littoral.

Il est intéressant de noter si cette algue devient proliférante en Atlantique et en Méditerranée occidentale.

RencontreEspèceStatutLieu de vieLocaliséeIntroduiteNon protégéeSur les côtes

### **Comment**la reconnaître ?

Une ou plusieurs lames en forme de feuille (appelées frondes) Lames douces et gélatineuses, typiques de l'espèce



Grande algue de forme variable Texture douce et gélatineuse Couleur : rouge à brune

### **De formes variables :**

La grateloupe est très polymorphe : elle peut prendre diverses formes :

A = lame simple avec des "barbilles" à la base /

B = plusieurs lames, simples ou divisées

C = lame simple dépourvue de barbille.



Elle préfère les cuvettes à marée basse où l'eau de mer circule en permanence.



© Claude Wacquant (doris.ffessm.fr)

### Cosmopolite

La grateloupe est originaire du Japon, mais on la rencontre dans presque tous les océans du globe où elle s'est peu à peu installée. Peu difficile, elle s'acclimate facilement et se disperse rapidement grâce à une reproduction sexuée efficace. Elle colonise ainsi de nouvelles régions où elle se fixe sur les rochers, cailloux et coquillages ou sur les pontons.

Elle supporte bien les eaux peu salées. Sur l'estran, elle s'installe volontiers dans les zones où des écoulements d'eau douce se mélangent à la mer, et peut localement être abondante.

### plus grande

La grateloupe grandit très vite : dans les zones abritées, en un été, elle peut atteindre jusqu'à 2 m de long ! Sa reproduction complexe se fait en 3 étapes comme celle de l'Asparagopsis (voir fiche Asparagopsis).

### Statutet menaces

Elle fait partie des espèces arrivées accidentellement au début des années 1970 avec des huîtres importées du Japon. Depuis, elle s'est répandue sur les côtes européennes, des Pays-Bas jusqu'au Portugal.

Mais son abondance fluctue au fil des années si bien qu'elle n'est pas devenue envahissante. Elle n'a donc pas d'impact notoire sur les autres espèces.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires



### Sargasse - Sargassum muticum

### **ALGUES BRUNES**

	-16
100 m	
(4)	TANK .
e Tourenne (doris,ffessm.fr)	ANDE
))	

La sargasse envahit parfois les cuvettes et les chenaux où l'eau subsiste à marée basse.

Rencontre	Espèce Statut		Lieu de vie
Commune	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

### **Comment** la reconnaître ?

Longs rameaux dressés avec nombreuses ramifications

Pseudo-feuilles

dont la taille

diminue du bas

de l'alque vers

le sommet

Petits flotteurs ovales, ou "aérocystes" (Ø = 5 mm), accrochés par un pédoncule



© Wilfried Bay-Nouailhat (mer-littoral.org)

Les aérocystes, remplis de gaz, maintiennent l'algue dressée

Identifiable à sa grande taille : 2 à 12 m! Forme générale : long rameau terminé en pointe Couleur : jaune verdâtre à brune

### a trouver ?

Sur l'estran : dans la laisse de mer (longs rameaux desséchés), ou dans les chenaux peu profonds et les cuvettes à marée basse (grands rameaux vivants). Sous l'eau: depuis l'estran jusqu'à 15 m de profondeur.

En période estivale. En hiver, les grands rameaux se désagrègent. Il ne reste que la base (<10 cm) de cette algue annuelle.

On cherche à recenser l'importance de la colonisation de cette nouvelle venue, en notant, pour chaque zone, la densité de ses peuplements.

### Une algue qui n'est pas difficile

La sargasse préfère les zones sableuses où elle se fixe sur tout objet dur : pierre, coquillage, etc.

Mais elle s'accroche aussi sur les fonds rocheux avec ses solides crampons.



© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)



BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

La sargasse grandit vite. jusau'à 10 cm par jour! Elle crée d'impressionnantes cathédrales sousmarines...



© Yann Fontana / Station Biologique de Roscoff

### **Trolifératio**

La sargasse comprend deux parties à durée de vie différente :

- La base est pérenne. Elle forme un disque, surmonté de quelques axes très courts (5 cm), qui est maintenu sur le fond par des crampons. C'est tout ce qu'il reste de l'algue en hiver.
- La partie supérieure est annuelle. Elle se développe au printemps en longs faisceaux très ramifiés.

La sargasse a été introduite accidentellement vers 1975 avec des huîtres provenant du Japon. Elle tolère toutes les températures (- 9° et + 30°C), grandit vite et se reproduit avec succès. Elle n'a donc pas eu de difficulté à s'acclimater aux eaux européennes où elle s'est répandue rapidement.

Elle appartient à la famille des fameuses algues flottantes de la Mer des Sargasses (au large des Bermudes) qui causèrent tant de problèmes aux navires de Christophe Colomb en route vers le Nouveau Monde.

La sargasse a colonisé tout le littoral européen, du Portugal iusqu'à la Norvège! On pense, aujourd'hui, que sa prolifération est stabilisée. Ne pouvant lutter contre son invasion, on pense à l'exploiter commercialement.

### www.biolit.fr

### Wakamé - Undaria pinnatifida



Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

Le Wakamé est une grande algue souple qui peut former des forêts denses.

### la trouver ?

Sur terre : dans la laisse de mer, souvent une lanière de l'algue déchirée. Sous l'eau : depuis le bas de l'estran iusqu'à 15 m environ, dans les endroits rocheux.

Du début du printemps à la fin de l'été, car cette algue annuelle dépérit ensuite.

### nous intéresse-t-elle ?

Le Wakamé a été introduit de façon volontaire en Bretagne dans les années 1980 pour des tests d'aquaculture... Depuis, il s'est échappé des cultures et s'est largement répandu sur nos côtes, de la Manche jusqu'au niveau de la Rochelle. Votre observation permettra de suivre la colonisation.

### **GOMMAN** reconnaître ?

Fronde découpée en grandes lanières

Une nervure médiane nette

Grande alque souple en forme de feuille très lobée Souvent on ne trouve au'une lanière arrachée à l'alque



Couleur : brun-jaunâtre Taille = 60 à 130 cm

### Chez les alques. on ne parle pas :

- de feuille mais de fronde.
- de tige mais de stipe,
- de racines mais de crampons.

Structures plissées à la base, plus ou moins développées

### Apprécié des gourmets

Une algueres tolérante

C'est une algue d'eau tempérée qui préfère les endroits éclairés et calmes. Très tolérante, elle supporte l'eau saumâtre comme l'eau de mer. Elle se fixe sur tout ce qu'elle

trouve : rocher, coque de bateau, digue,... et forme des forêts

Les structures festonnées qui entourent la base sont les

parties reproductrices. Elles libèrent les spores qui vont

donner des cellules sexuelles. Celles-ci se féconderont dans

l'eau et donneront naissance à une nouvelle plantule.

Le Wakamé est largement cultivé au Japon et en Corée (500 000 tonnes/an) où il entre dans la confection des salades et soupes. Il a été introduit en Bretagne à la fin du XXème siècle pour répondre aux besoins des restaurants japonais d'Europe.

### Le Wakamé change de forme au cours de sa vie :

Algue mature: - fronde large et découpée en grandes lanières

- structures plissées, plus ou moins importantes.



Ces 3 stades du développement du Wakamé ont été trouvés dans l'étang de Thau (Hérault).

Jeune algue : forme de feuille allongée, non découpée.

Cette algue s'est installée dans de nombreux autres pays (Australie, Nouvelle Zélande, Mexique, Argentine, Californie...) où elle est arrivée, soit fixée aux coques des navires, soit avec les cultures d'huîtres japonaises. Elle y pousse en forêts denses qui occultent la lumière et entrent en compétition avec les espèces locales.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires



### Méduse de la Mer Noire - Blackfordia virginica



la trouver ?

la laisse de mer

les lagunes

méduses.

Sur le rivage : échouée dans les dépôts de

Dans les zones portuaires, les estuaires et


Généralement au printemps ou lorsque les conditions sont favorables aux


Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie	
Rare	Potentiellement invasive	Non protégée	Estuaire, fleuve	

### Commen la reconnaître ?

Forme de dôme avec un sommet arrondi

en "X" sur la cloche





Taille: environ 4 cm Couleur: transparente

Originaire de la Mer Noire, elle a probablement été importée sur la côte Est d'Amérique du Nord avant 1910 dans les eaux de ballast de navires. Elle a ensuite été observée en Mer Baltique, en Inde, en Amérique, et au niveau du Sud-Ouest de l'Europe, dans la Loire, ainsi que dans le Golfe de Gascogne.

### **Une méduse**

friande de plancton

Elle raffole du zooplancton sous toutes ces formes: larves de balanes, copépodes ou encore larves et œufs de poissons. En cas de développement massive, elle pourrait modifier les liens dans la chaine alimentaire. que les scientifiques appellent aussi réseau trophique.

Son introduction pourrait présenter des impacts sévères potentiels liés au broutage du stock permanent du zooplancton et donc sur les écosystèmes associés.

Sa présence a récemment été signalée sur les côtes atlantiques. Vos observations sont précieuses pour déterminer plus précisément son aire de répartition et suivre l'étendue de sa répartition.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### www.biolit.fr

Sur cette photographie, vous pouvez observer les cils qui l'aident à se propulser.

### les trouver ?

Dans les eaux côtières peu profonde riche en matière organique. Elle tolère des variations de température et de salinités importantes et peu remonter dans les estuaires.

Toute l'année

Wikimedia Commons - CC-BY-SA

### nous intéresse-t-elle ?

Il est doté d'un fort potentiel invasif pouvant engendrer de grands changements dans l'écosystème qu'elle colonise.

Dans les zones fragilisées, la prolifération de l'espèce peut conduire à la quasi disparition du stock du zooplancton par prédation en l'espace de quelques heures à quelques jours. Il est responsable de l'effondrement des populations et des pêcheries d'anchois, maquereaux et sprats en mer Noire. L'impact de la prolifération des *Mnemiopsis* porte aussi sur le colmatage des filets de pêche, des conduites d'eau de refroidissement des centrales et entrainent l'anoxie des eaux (appauvrissement de la quantité d'oxygène dissout dans l'eau).

Vos observations permettront de suivre la progression de cette espèce.

### Mnemiopsis - Mnemiopsis leidyi




Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Commune	Cosmopolite	Non protégée	De la surface aux
Commune		Fort potentiel invasif	fonds des océans

### ies reconnaître ?

Le Mnemiopsis est un gélatineux de forme ovale et transparente. Il mesure de 3 à 12 cm de long. Composée de 6 lobes dont 2 principaux et 4 plus réduits avec 2 rangées de palettes ciliés sur les lobes principaux. Cet organisme est fortement réfléchissant à la lumière du soleil ou d'une lampe.

Réfléchit la lumière



### Une méduse ?

Bien que sa forme s'apparente à celle des méduses, le mnemiopsis n'en est pas une! Il ne possède pas de cellules urticantes mais des "colloblastes", cellules collantes. Il ne possède pas non plus de tentacules comme les méduses. Il appartient à l'embrachement des cténaires ou cténophores, contrairement aux méduses qui font partie des cnidaires.

Lorsque l'eau est au minimum à 12 degrés, elle peut se reproduire, et former de grands bancs



© Steven G. Johnson - Wikimedia Commons - CC-BY-SA

### n envahisseur

C'est un prédateur vorace qui consomme des organismes zooplanctoniques (copépodes, œufs et larves de poissons). Hermaphrodite, les grands individus sont capables de produire entre 2000 et 8000 œufs par ponte. Ces œufs donnent des larves qui deviennent des adultes miniatures en 20h seulement, qui pourront se reproduire au bout de 13 jours. Enfin, en cas de pénurie de la ressource alimentaire, il est capable de jeûner pendant 3 semaines.

Originaire de l'Atlantique (Côte Est du continent américain), il a été introduit par les eaux de ballasts en Mer Noire dans les années 80, il est aujourd'hui retrouvé en Mer Caspienne, Mer Egée, Mer Baltique, ainsi qu'en Mer du Nord et en Méditerranée. Il est également présent dans les étangs de Bages-Sigean (Languedoc-Rousillon), de Berre (Bouches du Rhone) et de Biguglia (Corse du Sud). C'est un prédateur très vorace (capable d'ingérer 10 fois son poids humide par jour)! L'espèce n'est donc pas menacée, mais à surveiller...

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires





la trouver ?

Cosmopolite des eaux chaudes et tempérées, on la trouve dans les eaux côtières, dans les ports, jusqu'à 5m de

profondeur.

Toute l'année?

2000, Bugula neritina

### Bugule brune - Bugula neritina

**BRYOZOAIRE** 



Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie	
Fréquente	Introduite	Non protégée	Sur les côtes	

### **Comment**la reconnaître ?

dichotomique



Couleur : brun violacée 5 à 10 cm de hauteur Forme des colonies en touffes

### Ramification



### À ne pas confondre

Des espèces comme Bugula minima et Bugula uniserialis dont elle se distingue car elle ne possède pas d'épine ni d'aviculaire. Ainsi, des analyses morphologiques et moléculaire sont nécessaires pour les distinguer.

lci on peut voir les cils des tentacules qui permettent notamment d'acheminer les particules alimentaires vers la



### Un remede contre le cancer ?

La découverte d'un composé chimique prometteur, la bryostatine, dans la bactérie symbionte de Bugula neritina ouvre de nouvelles perspectives dans la lutte contre le cancer.

Bryozoaire invasif et cosmopolite, Bugula neritina est l'un des organismes les plus importants des salissures marines. Il se prolifère rapidement par le fouling et les ballasts des bateaux. Malgré qu'elle ne supporte pas les eaux trop froides.





Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

est désormais

Depuis sa réintroduction dans les années

largement répandue et considérée comme cosmopolite. Compétitrice d'autres

### BioLit est un programme porté par





Dans les endroits abrités, la colonie pousse en hauteur et s'étale en lobes festonnés.

### e trouver ?

Depuis le bas de l'estran jusque vers 20 m de profondeur. Il s'installe sur tous les supports: roches, coquillages, pontons ou grandes algues

Toute l'année car il forme des colonies fixées sur le fond qui ne se déplacent pas selon les saisons.

La position et la distribution exacte de ce Watersipora étant incertaine jusqu'août 2014, ainsi même que son nom, en partie du à la confusion avec Watersipora arcuata, il est important de suivre la colonisation de ce bryozaire le long de nos côtes. Votre observation complètera les relevés déjà effectués.

### Bryozoaire orange vif et noir à points noirs Watersipora subatra **BRYOZOAIRE**

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Peu fréquente	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

### la reconnaître ?

Forme de "feuille" plaquée sur la roche



Points noirs disposés en lignes radiantes

Un fin cadre noir délimite les individus (1mm)

Plaques d'aspect lisse et brillant Couleur : orange au bord, rouge foncé à noir au Taille max: 25 cm de diamètre

### Dévoré sur place !



Bien qu'ils puissent s'abriter dans leur logette calcaire, les bryozoaires sont à la merci de certains prédateurs. Ici, la limace de mer orangée (en bas, à gauche) a brouté toute la partie vivante du bryozoaire. Il ne reste plus que le squelette calcaire blanchâtre







### animale

Ce bryozoaire a la forme d'une feuille, et pourtant c'est un animal! Ou plutôt une colonie rassemblant des milliers d'animaux qui sont minuscules (1 à 2 mm) et tous semblables. Chaque individu (zoïde), de forme très simple. est enfermé dans une logette calcaire fermée par un opercule noir. Pour se nourrir, le zoïde soulève l'opercule et déploie sa couronne de tentacules qui filtrent les algues microscopiques.

La partie centrale de la colonie, souvent noire, est la plus ancienne. La périphérie orange vif est la plus récente : c'est la zone de croissance de la colonie.

### pionnière

Il est l'une des premières espèces à s'installer sur les surfaces nues, en particulier sur les coques des navires. C'est ainsi qu'il a traversé les océans et qu'il s'est répandu dans les régions tempérées chaudes du globe. Il s'acclimate facilement car il supporte une large gamme de températures et de salinités.

Importé involontairement avec des huîtres japonaises, il est arrivé en France dans les années 1980. Très résistant aux antifouling\*, il se fixe sur les coques, et, comble de l'ironie, offre aux autres organismes sa surface non toxique où ceux-ci peuvent, à leur tour, s'installer!



### Ascidie cartilagineuse - Corella eumyota



### finemophs (c) BYANG

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Introduite	Non protégée	Zone portuaire, sur l'estran

### **Comment** la reconnaître ?

Intestin en forme de U

### la trouver 2

Sur n'importe quel substrat dur (naturel ou artificiel) avec une prédilection pour les zones portuaires. Elle se rencontre également sous les roches au niveau de l'estran.

### Quanta trouver £

Il s'agit d'une espèce d'origine tempérée froide et subpolaire qui a tendance à se développer plus fortement dans des eaux relativement froides en période hivernale.

### POUTQUOI nous intéresse-t-elle ?

Elle a été découverte pour la première fois dans l'hémisphère nord en 2002, sous des pontons flottants dans les ports de Camaret-sur-mer (Finistère) et de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor). Depuis l'espèce s'est rapidement développée et on la rencontre désormais principalement sur les côtes bretonnes et normandes. Tout signalement permettra de mettre à jour la carte de répartition de l'espèce.



Consistance élastique dans l'eau cartilagineuse hors de l'eau

Taille : elle peut atteindre 40mm Couleur : blanchâtre voir orange translucide

### À ne pas confondre avec...

Des espèces telles que Molgula sp. ou Corella parallelogramma dont elle se distingue par la forme en U de l'intestin, alors que l'intestin des Molgula sp. ou Corella parallelogramma présente une forme en S et L respectivement.

L'espèce Ascidiella aspersa qui partage le même habitat.

BioLit est un programme porté par



### Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### Merci à tous nos relecteurs pour leur aide bienveillante (Muséum d'Histoire Naturelle, experts divers)

### Stratégie de protection La tunique de Corella eumyota présente un pH acide très

Introduction

danoises ainsi qu'en Méditerranée occidentale.

biodiversité locale et l'aquaculture.

Elle a été signalée en 2002 en France, aujourd'hui, on la

retrouve sur les côtes portugaises jusqu'aux côtes

Les enquêtes cherchant à définir leur aire de répartition ont montré que la colonisation a augmenté rapidement. Ceci peut impliquer des impacts potentiels sur la

La tunique de *Corella eumyota* présente un pH acide très marqué (de l'ordre de 2). Cette particularité évite toute fixation d'autre organisme sur elle. La production d'un pH si faible est possible notamment grâce à la présence de vacuoles contenant de l'acide sulfurique.

Comme beaucoup de tuniciers, elle possède la capacité de concentrer le vanadium (métal dur) dans ses tissus. Ceci la rend probablement moins attractive pour les prédateurs potentiels.

### Statutet menaces

Malgré son caractère invasif marqué, comme d'autres espèces de tuniciers, cette espèce ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation en France ou dans l'Union Européenne. Cependant, elle peut entrer en compétition avec la faune locale et les élevages conchylicoles.

BioLit
Les observateurs du littoral
www.biolit.fr

### Ascidie massue - Styela clava

ou ascidie plissée

Le sommet est couvert

de bosses



A marée basse, l'ascidie se rétracte. Le corps se plisse et les siphons se ferment. RencontreEspèceStatutLieu de vieFréquenteIntroduiteNon protégéeSur les côtes


### **Comment** la reconnaître ?

Les 2 siphons sont typiques des ascidies :

L'eau entre par le siphon buccal

(la bouche)

L'eau ressort par le siphon cloacal (l'anus)



Le pédoncule fait 1/3 de la hauteur totale

Schéma de la structure interne d'une ascidie.

### la trouver ?

Le corps est plissé

Sur les côtes rocheuses de la côte atlantique et de la Manche, depuis la zone de balancement des marées jusqu'à 50 m de profondeur. Elle se fixe partout : sur les rochers, les coquillages, les algues, mais aussi les bateaux, les digues et pontons.

### QUanta trouver?

En toutes saisons.

### POUTQUO nous intéresse-t-elle ?

C'est une espèce invasive dont on suit la colonisation. Celle-ci semble rapide le long de nos côtes, à la faveur des mouvements des bateaux et des transports d'huîtres et moules.

Formée d'une partie renflée (= l'animal) et d'un pédoncule Surface extérieure (tunique) ferme comme du cuir Couleur : brune, marbrée de blanc Taille totale max = 18 cm Sous l'eau le corps de l'ascidie se "déplisse" et les siphons ouverts sont bien visibles.



© Véronique Lamare (doris.ffessm.fr)

### Fommen vit-elle?

L'ascidie est un animal filtreur. L'eau entre par le siphon buccal. Elle est filtrée par les branchies qui tapissent l'intérieur puis expulsée par le siphon cloacal. Au passage, les branchies prélèvent l'oxygène et retiennent les micro-organismes. Ceux-ci sont ensuite digérés dans l'estomac. Les résidus sont évacués par l'intestin.

### La plus évoluée

### des invertébrés

Malgré son air primitif, l'ascidie est plus proche de nous que le poulpe ou le crabe ! Sa larve, semblable à un têtard avec sa longue queue, possède en effet une "chorde", ancêtre de la colonne vertébrale. Mais dès que la larve se fixe sur le fond, elle se métamorphose : ses organes sensoriels et sa queue disparaissent, des branchies apparaissent, et elle prend la forme d'une outre munie de 2 siphons.

### Statumenaces

L'ascidie massue est originaire du Pacifique nord-ouest. Elle est arrivée en Angleterre dans les années 1950, accrochée à la coque de bateaux revenant de Corée. Depuis, elle s'est répandue sur les côtes européennes, de la mer du Nord à la Méditerranée, car elle tolère des températures de -2° à +25°C! Lorsqu'elle pullule (jusqu'à 1000/m2), elle entre en compétition avec les coquillages qui filtrent aussi le plancton.

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires






### Crabe bleu américain - Callinectes sapidus

CRUSTACES





Il peut s'attaquer aux espèces prises dans les filets et les abimer. Ici, on voit bien ses pattes natatoires nalmées.


On le trouve rarement sur les côtes atlantiques et parfois en Méditerranée occidentale. Le crabe bleu est capable de supporter d'importantes variations de salinité et se retrouve souvent dans les zones d'estuaires, fleuves mais aussi dans la zone intertidale jusqu'à 90m.

La première observation en Méditerranée du crabe bleue date de 1951 à Venise (Italie). Depuis plusieurs populations se sont installées de façons permanentes sur les côtes italiennes et orientales de la Méditerranée. Sur les côtes françaises, aucun signalement permanent n'a encore été fait. Vos observations sont précieuses afin de connaître la répartition et l'installation de l'espèce.

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Invasive	Non protégée	Estuaire, fleuve, estran

### Commente reconnaître?

La couleur bleue de ses pinces, achevées par une fine zone rouge ainsi que la taille de sa carapace (deux fois plus large que longue) sont caractéristiques. Sa carapace est d'une couleur comprise entre le gris et le marron. Aucun risque de confusion avec une autre espèce n'est théoriquement possible.



### Taille de la carapace : 20 cm de large, 9 cm de long

### MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

### AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ



www.afbiodivsersite.fr

### Comment

Les femelles crabes ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie, pour cela elles migrent dans une zone d'eau salée où elle vont pondre leurs œufs en très grand nombre. Les larves se développent dans les zones salées. les individus adultes remontent par la suite dans les zones d'estuaire ou plus généralement dans des eaux saumâtres Le crabe bleu américain peut avoir des comportements cannibales

### **Une solution**

Le crabe bleu d'Amérique est consommable par l'homme il peut donc aussi représenter une ressource de pêche. Aux Etats-Unis lorsque sa carapace est molle après sa mue, il est consommé entier dans des sandwiches ou des beignets.

Le crabe bleu est un prédateur vorace et féroce, il peut consommer des coquillages (jusqu'à 600 palourdes par jour), des espèces benthiques et s'attaquer aux poissons prisonniers d'engins de pêche et causer des dégâts sur ces mêmes engins. C'est aussi un compétiteur potentiel d'autres espèces de crabes. De plus, c'est un nageur très performant capable de parcourir 15 km par jour. Ces caractéristiques biologiques ainsi que les changements environnementaux favorables actuels, font du crabe nageur une espèce à fort potentiel invasif sur les côtes françaises.



### **Crabe chinois à mitaines** - Eriocheir sinensis



Zoom sur les dents antéro-latérales.

### le trouver ?

### Quande trouver?

Le jour, il se tient dans des terriers creusés dans les berges, et sort la nuit. De juillet à octobre, on peut le retrouver en mer pendant la période de reproduction. Les jeunes remontent les fleuves au printemps.

### **Pourquoi**

Le crabe chinois est originaire d'extrêmeorient (Chine et environs). En Méditerranée, il n'a été signalé que dans le Languedoc-Roussillon (mais disparu depuis), dans le delta du Rhône et dans l'Adriatique. Sa tolérance aux conditions environnementales en font une remarquable espèce invasive. Votre observation permettra de suivre sa répartition.

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Introduite	Espèce invasive	Sur les côtes

### **Comment**er reconnaître?

### Bout des pinces blanches



Couleur: brun / brun clair Taille maximale: 9 cm

### Des mitaines ?

Les pinces du mâle sont couvertes d'un manchon de poils, ce qui justifie son nom de "crabe à mitaines"



BioLit est un programme de



### Incidences t gestion

Il perturbe le fonctionnement des écosystèmes et entre en compétition avec certaines espèces locales, comme le crabe

On le retrouve dans les nasses à anguilles, et dans les chaluts à crevettes, occasionnant des dégâts dans les filets des pêcheurs. Il détériore et fragilise les berges des cours d'eau et crée une forte érosion en creusant des galeries de plus de 80cm de profondeur.

### Un crabe de la cra

Le crabe chinois est végétarien au début de sa vie, puis devient prédateur en grandissant. Il apprécie particulièrement les mollusques bivalves et gastéropodes, les crustacés, les vers et les larves d'insectes.

### Consommation

Menacée par la surpêche dans son aire d'origine, la consommation de cette espèce n'est pas sans risque. En effet, le crabe chinois à mitaine peut véhiculer une parasitose et d'autres bactéries pouvant causer des dérèglements digestifs chez l'homme.

### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr



Photo prise dans les Caraïbes (en Guadeloupe) où le percnon est commun.

Sur les rochers, dans la zone mouillée par les vagues. Mais il est difficile à observer, car ce petit crabe ultra plat se cache facilement.

Sous l'eau, on l'aperçoit à faible profondeur (0 à 2 m), dans les rochers entre lesquels il trouve refuge.

### Quantie trouver?

Principalement à la belle saison.

### Pourquoi nous intéresse-t-il ?

Cette espèce est arrivée récemment en Méditerranée. Elle a été observée pour la première fois en 1999 sur la petite île Linosa, au sud de la Sicile. On soupçonne son arrivée en Corse. Votre observation permettra de suivre sa colonisation.

### Sally pied léger - Percnon gibbesi




Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

### Commente reconnaître?

Pinces plus courtes que les pattes marcheuses

4 épines de chaque côté de la carapace



Bandes jaunes sur les pattes au niveau des articulations

Minuscule crabe
Couleur : Brune
Carapace ultra plate, assez ovale
Taille carapace : largeur max = 3 cm



Avec sa carapace ultra plate et ses pattes largement étalées, le percnon peut se glisser sous les épines d'un oursin!

### In craherbivore

original parmi les crabes puisqu'il est plutôt actif de jour et qu'il se nourrit exclusivement d'algues. Il prélève avec ses pinces le duvet de jeunes algues sur les rochers.

Il se distingue aussi par le fait que ses larves séjournent longtemps dans le plancton\*. Emportées par les courants, elles peuvent parcourir de longues distances avant de s'installer sur les fonds rocheux. C'est ainsi qu'elles colonisent des rivages lointains.

### Un voyageur clandestin

Le percnon est présent dans les eaux tropicales de chaque côté de l'océan Atlantique : de la Floride au Brésil, et du Maroc au golfe de Guinée. On pense qu'il est arrivé en Méditerranée via les eaux de ballast des navires. En effet, au départ des traversées, les cargos pompent de l'eau de mer dans leurs ballasts pour se stabiliser, et la relâchent à leur arrivée. Ils transportent ainsi toutes sortes d'œufs, larves et créatures du plancton d'un océan à l'autre.

### **Statut**enace

Il semble se répandre rapidement. En Méditerranée, on l'observe maintenant des îles Baléares jusqu'en Turquie.

\*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de







### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### Cascail - Ficopomatus enigmaticus

### ANNÉLIDES





Vue sur un récif de cascail.

### la trouver ?

Dans les eaux saumâtres, salées, peu profondes, turbides et riches en matière organique.

### Quantie trouver?

Toute l'année.

### Pourquoi nous intéresse-t-il?

Originaire des régions tempérées de l'hémisphère sud (côtes ouest et sud de l'Australie), l'espèce a été introduite accidentellement sur nos côtes par les salissures de coques de bateaux, ou sous forme larvaire dans les eaux de ballasts. Votre observation permettra de suivre sa répartition.

### Rencontre Espèce Statut Lieu de vie Commune Exotique Espèce invasive Sur les côtes

### Commenter reconnaître?

L'opercule du tube est brune avec des cernes blanches

Tubes calcaires presque droits



Taille: 2 à 4 centimètres (jusqu'à 10 maximum)
Couleur du tube: brune avec des cernes blanches



Non, ce ne sont pas des mégots, mais bel et bien des vers.

### RÉCT de calcaire

Les récifs formés par l'accumulation des tubes peuvent contenir 700kg de calcium et 50kg de sédiments. Ils modifient profondément l'écosystème en augmentant la sédimentation et en offrant un substrat dur favorisant la colonisation de ce récif par d'autres espèces.

### Un Ve lingénieur

Le cascail peut modifier rapidement un écosystème de façon physique, chimique et biologique. Il favorise la faune benthique qui se réfugie dans son enveloppe : c'est une espèce dite « ingénieure », c'est-à-dire qu'elle fabrique un nouvel habitat, par sa présence.

### Une espèce opportuniste

Les premiers individus à l'origine d'un récif peuvent se fixer sur des végétaux aquatiques, des coquilles de gastéropodes, de bivalves, de crabes et même des tortues et sur tout substrat dur (roches, quais, piliers, portes d'écluse, bouteilles).



### **Dimorphisme sexuel**

Le mâle a une couleur verdâtre, tandis que la femelle est plutôt orangée et rouge.



BioLit est un programme de



### www.biolit.fr

# Wikimedia Commons - CC-BY-SA

Sur cette photographie, vous pouvez observer les cils qui l'aident à se propulser.

### les trouver ?

Dans les eaux côtières peu profonde riche en matière organique. Elle tolère des variations de température et de salinités importantes et peu remonter dans les estuaires.

Toute l'année

### nous intéresse-t-elle ?

Il est doté d'un fort potentiel invasif pouvant engendrer de grands changements dans l'écosystème qu'elle colonise.

Dans les zones fragilisées, la prolifération de l'espèce peut conduire à la quasi disparition du stock du zooplancton par prédation en l'espace de quelques heures à quelques jours. Il est responsable de l'effondrement des populations et des pêcheries d'anchois, maguereaux et sprats en mer Noire. L'impact de la prolifération des Mnemiopsis porte aussi sur le colmatage des filets de pêche, des conduites d'eau de refroidissement des centrales et entrainent l'anoxie des eaux (appauvrissement de la quantité d'oxygène dissout dans l'eau).

Vos observations permettront de suivre la progression de cette espèce.

### Mnemiopsis - Mnemiopsis leidyi


### **CTÉNOPHORES**

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Commune	Cosmopolite	Non protégée Fort potentiel invasif	De la surface aux fonds des océans

### les reconnaître ?

Le Mnemiopsis est un gélatineux de forme ovale et transparente. Il mesure de 3 à 12 cm de long. Composée de 6 lobes dont 2 principaux et 4 plus réduits avec 2 rangées de palettes ciliés sur les lobes principaux. Cet organisme est fortement réfléchissant à la lumière du soleil ou d'une lampe.

Réfléchit la lumière



### Une méduse ?

Bien que sa forme s'apparente à celle des **Médwiep**sisle n'en est pas une! Il ne possède pas de cellules urticantes mais des "colloblastes", cellules collantes. Il ne possède pas non plus de tentacules comme les méduses. Il appartient à l'embrachement des cténaires ou cténophores, contrairement aux méduses qui font partie des cnidaires.

Lorsque l'eau est au minimum à 12 degrés, elle peut se reproduire, et former de grands bancs



© Steven G. Johnson - Wikimedia Commons - CC-BY-SA

C'est un prédateur vorace qui consomme des organismes zooplanctoniques (copépodes, œufs et larves de poissons). Hermaphrodite, les grands individus sont capables de produire entre 2000 et 8000 œufs par ponte. Ces œufs donnent des larves qui deviennent des adultes miniatures en 20h seulement, qui pourront se reproduire au bout de 13 jours. Enfin, en cas de pénurie de la ressource alimentaire, il est capable de jeûner pendant 3 semaines.

Originaire de l'Atlantique (Côte Est du continent américain), il a été introduit par les eaux de ballasts en Mer Noire dans les années 80, il est aujourd'hui retrouvé en Mer Caspienne, Mer Egée, Mer Baltique, ainsi qu'en Mer du Nord et en Méditerranée. Il est également présent dans les étangs de Bages-Sigean (Languedoc-Rousillon), de Berre (Bouches du Rhone) et de Biguglia (Corse du Sud). C'est un prédateur très vorace (capable d'ingérer 10 fois son poids humide par jour)! L'espèce n'est donc pas menacée, mais à surveiller...

BioLit est un programme porté par



Il est animé localement grâce à des structures relais partenaires

### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### Moule asiatique - Arcuatula senhousia



10 Per 10	
77.	
(5.750ac)	
STEEL STEEL	
NAME OF	
No. of the last	
STATE OF THE STATE	
The state of the s	
THE REAL PROPERTY.	

La moule asiatique vit à moitié enfouie dans le sable vaseux des endroits bien abrités.
Elle aspire l'eau de mer et la filtre pour en retirer sa nourrituregrâce à un siphon, sorte de "tuba" qu'elle étend hors de ses valves.

### la trouver ?

Dans les étangs, les lagunes et les estuaires, toujours dans les zones abritées où elle vit depuis la surface jusqu'à -20 m. Elle n'est pas facile à voir car elle est à moitié enfouie dans le sable. On ne trouve souvent que des coquilles vides.

### Quanta trouver?

### Pourquoi nous intéresse-t-elle

Pour suivre la colonisation de cette nouvelle venue et dresser sa carte de répartition sur le littoral français. RencontreEspèceStatutLieu de vieRareIntroduiteNon protégéeSur les côtes

### Commenta reconnaître ?

Couleur : vert pâle avec des bandes brunes irrégulières

Les deux valves sont symétriques : Face externe Face interne



Petit coquillage
Taille max = 2,5 cm
Coquille plus bombée et plus dissymétrique que celle de la moule

Les moules fabriquent un long byssus qui lesenveloppe, les attachent les unes aux autres, et les aident à se maintenir dans le sable meuble.



© Natural History Museum Rotterdam

### pavements<sub>de moules</sub>

C'est un animal à durée de vie courte (2 ans) qui grandit vite : les jeunes atteignent la taille adulte en un an ! Après 1 à 2 mois dans le plancton\*, les jeunes moules descendent sur les fonds de sable. Elles s'y enfoncent à demi et sécrètent un faisceau de filaments très résistants (byssus) qui les maintiennent accrochées les unes aux autresautres (photo ci-dessus). Elles forment par endroits de grands bancs, les moulières, qui tapissent le fond.

### **Importée**du Japon

La moule asiatique a été observée en Méditerranée pour la première fois en 1960, sur les côtes d'Israël. Puis dans l'étang de Thau, dans les années 1980. Importée du Japon avec des huîtres, elle est aujourd'hui implantée dans les principaux lieux d'élevage : étangs du Languedoc, delta du Pô, lagunes de Venise et de Tunis. Et dans les autres pays du monde où l'on a introduit les huîtres japonaises.

### Statumenaces

Elle a toutes les caractéristiques d'un animal invasif : durée de vie courte, forte fécondité et croissance rapide. De plus, elle supporte les grandes variations de température ou de salinité, et les eaux peu oxygénées. Aussi peut-elle pulluler et envahir localement les fonds marins, au détriment des autres habitants.

BioLit est un programme de







\*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent au gré des courants.

### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### Moule de la mer Rouge - Brachidontes pharaonis

**MOLLUSQUES** 



La surface rugueuse est une caractéristique notable de cette espèce.

Dans les zones marines abritées et peu profondes, dans les eaux polluées (eaux usées, industrielles) et dans les eaux hypersalées.

### Quandatrouver?

Toute l'année, en toutes saisons.

### Pourquoi nous intéresse-t-elle :

Cette espèce requiert une vigilance particulière, car elle se propage facilement par ses larves pélagiques et par le transport maritime.

Elle n'a pas encore été observée sur les côtes françaises. Vos observations permettront de suivre sa répartition sur le littoral méditerranéen.

RencontreEspèceStatutLieu de vieRareIntroduiteEspèce invasiveSur les côtes

### Commentare connaître?

Nervures sculptées caractéristiques de l'espèce

2 valves allongées identiques en taille et en forme



Couleur : brune foncée à noire Taille maximale : 4 cm



L'intérieur de la coquille a des reflets violets nacrés.

### Invasion Rouge

C'est un exemple classique d'espèce introduite en Méditerranée suite à l'ouverture du Canal de Suez en 1869. Elle a été premièrement signalée en Égypte en 1876. Compte tenu de son fort caractère invasif, les scientifiques lui portent une attention particulière sur les côtes méditerranéennes.

### **Statut**et menaces

En tant qu'espèce invasive, elle n'est pas protégée. Elle est inscrite dans la liste noire des espèces invasives de Méditerranée de l'UICN.



L'épithète *pharaonis* a été choisie par rapport aux nervures de la coquille, qui rappellent les plastrons des pharaons.



BioLit est un programme de



### www.biolit.fr



Les crépidules forment souvent des chaînes de 10 à 20 individus.

la trouver ? Sur le rivage où la crépidule peut être rejetée par les vagues. Les animaux vivants restent souvent empilés. Les coquillages morts sont, en revanche, dispersés. Sous l'eau, elle est fixée sur les rochers ou sur d'autres animaux.

# The strought of the strought of the strought of the strong of the strong

Originaire des côtes américaines, elle a été introduite en Europe avec des huîtres au XIXème siècle. D'abord en Angleterre et en Bretagne où elle est devenue très abondante. Puis, en Méditerranée où elle est encore discrète. Votre observation permettra de suivre la progression de cette espèce invasive.


### Crépidule - Crepidula fornicata

ou pantoufle de mer

MO	LLUSQUES

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Introduite	Non protégée	Sur les côtes

### Commenta reconnaître ?



Couleur : blanche rosée ou iaunâtre Taille: 5 cm de long (max 10 cm)

### A ne pas confondre avec...

Il existe 2 autres espèces voisines qui, elles, sont natives de Méditerranée : Crepidula moulinsi et Crepidula unauliformis. Toutes deux sont plus petites (< 1 cm), avec une coquille fragile et mince qui se brise souvent dans le ressac des vaques.

Les crépidules se fixent parfois sur un autre animal, ici un crabe vert.



© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)

### **Pen communauté.**Les crépidules vivent à faible

profondeur, près des côtes. Elles se fixent les unes les autres, grâce à leur pied qui fait ventouse, et forment des chaînes comptant jusqu'à 20 individus. Les femelles occupent la base tandis que les mâles sont au sommet.

Une stratégie de reproduction très efficace (fécondation directe et protection des œufs) leur permet une colonisation rapide. D'autant plus qu'elles résistent aux grandes variations de température et de salinité qui sont mortelles pour d'autres espèces.

### **Tanssexu**

Les crépidules changent de sexe au cours de leur vie : elles sont d'abord mâles, puis femelles! Mieux, elles peuvent changer de sexe selon les évènements : lorsqu'un jeune mâle se fixe sur un autre, celui de dessous devient femelle. De même, lorsque l'empilement de plusieurs crépidules est détruit, et que les mâles qui étaient au sommet de la pile se retrouvent à la base, alors ils deviennent femelles.

Introduite en Méditerranée dans les années 1980. elle pourrait entrer en

compétition pour la nourriture avec les coquillages bivalves (moules et huîtres), comme elle le fait déjà en Atlantique. En effet, elle se nourrit en filtrant le plancton\* dans l'eau de mer. comme les bivalves.

\*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de



Merci à nos partenaires techniques





### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### **Huître creuse** – Magallana gigas





l a	couleur	varie	en	fonction	dec	individus.	
La	coureur	varie	CI I	TOTICLION	ues	iiiuiviuus.	

RencontreEspèceStatutLieu de vieFréquenteIntroduiteEspèce invasiveSur les côtes

### Commenta reconnaître?

Mauve ou verdâtre Une valve plate



### Incidence St gestion

L'huître creuse représente la première production conchylicole française, et une des espèce de coquillage les plus cultivées à l'échelle mondiale en aquaculture. Elle représente donc une économie locale importante.

### **Menaces**

Le développement de massifs d'huitres et la colonisation de substrats rocheux modifient les processus sédimentaires et peuvent induire une compétition trophique avec les autres animaux filtreurs. La gestion de cette huitre nécessite des programmes d'entretien du littoral très couteux.

### Origines, invasion

Originaire du Pacifique Nord-Ouest, elle a fait l'objet d'introductions volontaires aux quatre coins du monde.

Introduite en Europe à la fin des années 60, elle a été importée massivement en France au début des années 70 pour remplacer l'huître creuse portugaise.

### Stries de croissances marquées

L'huitre creuse vit depuis la surface jusqu'à 80 m de profondeur, plutôt le long des côtes abritées, dans la zone des marées, même dans des eaux peu salées. Elle se fixe sur les substrats durs (roche,

### Quanta trouver?

Toute l'année, en toutes saisons.

poteaux, quais).

### Pourquoi nous intéresse-t-elle?

Quand les bonnes conditions sont réunies, elle peut former de véritables récifs, ce qui entraine une uniformisation de la communauté benthique. Vos observations permettront de suivre la progression de cette espèce.





La taille varie en fonction de l'âge, mais la forme reste allongée et ovale.

### *Crassostrea* ou *Magallana gigas*?

Les deux noms correspondent à la même espèce, car la distance génétique entre ces 2 types d'huîtres est trop faible pour justifier leur séparation en tant qu'espèces distinctes. Aujourd'hui seul *Magallana gigas* est valide.



Une valve creuse





### Rapane veiné – Rapana venosa





Lieu de vie Sur les côtes Occasionnelle Introduite Espèce invasive

### Commente reconnaître ?

Coquille volumineuse, globuleuse et sculpturale en forme de spirale

Grande ouverture



Ponte de rapane veiné.

### e trouver ? On peut le trouver dès les petits fonds, enfoui dans les substrats meubles, ne laissant dépasser du sediment que le bout de son siphon, et sur le rivage quand il se trouve rejeté par les vagues.

### blanches dans le sens de Quand trouver? l'enroulement

Cernes

Toute l'année, notamment la nuit (période de prédation).

### Pourquoi intéresse-t-il?

Originaire d'Asie, on cherche à suivre la progression de cette espèce sur la façade méditerranéenne.

Vos observations sont précieuses pour le suivi de l'évolution et de la répartition de cette espèce.



Couleur de l'ouverture : orange foncée à jaunâtre Taille: 18 cm de long pour 10 cm de large

### Redoutable rédateur

Le rapane est un prédateur nocturne actif et un grand carnivore : il choisit ses proies, les étouffe, sécrète un mucus toxique et perce leur coquille pour se nourrir. Il apprécie notamment les huitres et les palourdes.

### Statut menaces

D'origine asiatique (mer du Japon, mer de Chine), le rapane veiné a été introduit en mer Méditerranée par le commerce international de coquillages, et par les eaux de ballasts dans différentes parties du monde. Il est également présent en Manche et en mer du Nord.

Le transport de palourdes l'a introduit dans l'étang de Berre en 2015.

### À ne pas confondre avec... le Pourpre (Stramonita haemastosoma)

La coquille est plus petite (jusqu'à 8 cm) et plus allongée, son ouverture est moins large et moins haute.



BioLit est un programme de





### www.biolit.fr



Asparagopsis taxiformis sur les côtes des Pyrénées orientales.

es trouver ? Sur le rivage : dans les dépôts de la laisse de mer. En mer : sur les fonds rocheux, à faible profondeur sous la surface.

En hiver et au printemps, on peut trouver des rameaux de ces algues annuelles.

A. taxiformis pousse dans les régions chaudes de l'Atlantique. Elle vit aussi en Méditerranée orientale (plus chaude) et progresserait d'est en ouest. La première observation en Provence date de 2006. A. armata est originaire de Nouvelle Zélande et Australie. Elle est arrivée en Méditerranée vers 1925. Observée en Catalogne et ouest-Provence, elle forme des couvertures

On cherche donc à suivre l'installation de ces deux espèces arrivées récemment en France.

### Asparagopsis à crochets - Asparagopsis armata Asparagopsis if - Asparagopsis taxiformis

Statut Lieu de vie Rencontre Espèces Rare Introduites Non protégées Sur les côtes

### Commente les Asparagopsis ?

**Allure** du rameau en "asperge" Rameaux terminés par une touffe pyramidale dense

Nombreuses ramifications alternées



Les 2 espèces sont très semblables : Couleur rose clair à rouge (parfois tirant sur le jaune) Taille du rameau : 15 à 30 cm

### **Comment différencier** les 2 espèces ?

Asparagopsis armata a des rameaux portants de petites épines recourbées en harpons (d'où son autre nom : harpon de Neptune).

Asparagopsis taxiformis n'en a pas.



L'alque vue sous l'eau.

Ces petits pompons cotonneux  $(\emptyset = 1 \text{ à } 2 \text{ cm}).$ faits de filaments fins. sont les amas de spores

de l'Asparagopsis.



© Daniel Buron (doris.ffessm.fr)

### vivent-elles ?

vivent sur les rochers près des côtes, depuis la surface jusque vers 10 m de profondeur. A. armata est souvent accrochée à d'autres algues par ses harpons. Ce sont des algues annuelles dont la forme buissonnante se développe en hiver-printemps, puis disparaît après la reproduction.

On a longtemps cru que les "buissons" et les "pompons" étaient deux espèces d'algues. Mais, en les faisant pousser en laboratoire, on a constaté qu'il s'agit en réalité des deux formes que l'algue prend au cours de son cycle de vie.

La forme "buisson de rameaux" (qui compte des pieds mâles et des pieds femelles) produit les cellules sexuelles. Après fécondation (qui a lieu sur les rameaux), le "buisson" libère des spores qui, en grossissant, forment des pompons roses et sont emportés par les courants. En germant, ces pompons donnent naissance à un nouveau pied d'Asparagopsis.

Ces alques sont invasives. Elles ne sont pas broutées par les herbivores car elles possèdent des toxines dans leurs tissus. Elles se multiplient rapidement sur nos côtes.

BioLit est un programme de



Merci à nos partenaires techniques







### Caulerpe grain de raisin - Caulerpa cylindracea

ALGUES VERTES





Ici, ces caulerpes s'implantent dans un champ d'algues. Leur développement peut être rapide et problématique,

Introduite au XXème siècle en Méditerranée (première observation en Lybie en 1990), elle a depuis conquis toute la Méditerranée. On peut, ainsi, la trouver depuis la surface jusqu'à 70m de profondeur, sur tous type de fonds en dehors du sable meuble.

# Toute l'année! POUTQUOI nous intéresse-t-elle?

Bien que certaines espèces puissent la consommer, la *Caulerpa cylindracea* produit des toxines qui limitent grandement sa consommation. Elle peut couvrir complètement une zone en quelques mois après son arrivée, au détriment des espèces présentes, qu'elle remplacera. Il faut donc bien suivre son évolution pour prévenir la modification ou la destruction de certains habitats fragiles.

Rencontre Espèce Statut Lieu de vie
Occasionnelle Invasive A suivre Toute la Méditerranée,
du bord à 80m de fond

Ramules (aspect de pépins de raisins) disposés en deux rangs opposés

### Commenta reconnaître?

Elle possède une tige principale (ou stolon) verte, de 0.7 à 2 mm de diamètre. Sur le stolon sont fixés des ramules verts de 7mm de long, sorte de cylindres en forme de massue, qui sont disposés en deux rangs opposés de part et d'autre du stolon, orientés vers le haut. L'aspect épais des stolons fait penser à des pépins de raisins.



© Rachel Woodfield - CC-BY-NC

Taille : en général 3-6 cm Jusqu'à 19 cm

### Invasion

Cette Caulerpe est une espèce d'origine australienne! En effet, cette espèce est endémique de la côte sud-ouest de l'Australie. Elle à remplacé la posidonie à Chypre en six ans seulement, elle mérite donc ses lauriers d'espèce invasive.

### **Comment**

Vous pourrez l'observer en pleine croissance d'avril à décembre. Elle peut se multiplier de deux façons : par reproduction sexuelle, et par fragmentation (ou bouturage), c'est à dire qu'une partie de la plante va former une plante complète. On ne sait pas quels paramètres déclenchent sa reproduction sexuelle.

### **Statili**nenaces

Entant qu'espèce invasive, elle n'est pas protégée. Elle est par contre à surveiller!



### Racémosa. Cylindracea?

Longtemps appelée « Racemosa », c'est bien de la « cylindracea » dont il s'agit.







www.afbiodivsersite.fr



Merci à tous les experts et relecteurs pour leurs contributions



### Caulerpe feuille d'if - Caulerpa taxifolia

ALGUES VERTES



la trouver ?

Elle se rencontre sur les fonds sableux, sédimentaires, rocheux, vaseux et à coralligènes. En Méditerranée, on la rencontre rarement au delà de 30 m de profondeur, bien qu'elle ait pu être observée jusqu'à 80 m.

### Quanda trouver?

La croissance des stolons commence en Mai-Juin, la croissance la plus importante s'observe en aoûtseptembre.

### Pourquoi nous intéresse-t-elle ?

Elle a été introduite accidentellement dans les années 80 par un aquarium monégasque où elle était utilisée pour la décoration. L'individu en question a colonisé rapidement la Méditerranée nord occidentale par bouturage (clonage). Un fragment peut donner naissance à une nouvelle colonie. L'expansion se fait ensuite de proche en proche. Un morceau de cette alque peut survivre 10 jours dans un lieu humide à l'abri de la lumière, comme sur une combinaison de plongée, une ancre ou des filets de pêche. Une fois relâchée dans le milieu, le fragment pourra se régénérer et produire une nouvelle colonie. L'espèce n'a pas encore été vue en Corse.

Rencontre Espèce Statut Lieu de vie
Fréquente Invasive Non protégé Toute la Méditerranée, du bord à 80m de fond

### Commenta reconnaître?

Sa couleur verte presque « fluorescente » est caractéristique. Elle se présente sous la forme d'un stolon rampant terminé par des rhizoïdes qui lui servent de « crampons ». De ce stolon dérivent des frondes (sorte de tiges) bordées par des pinnules (feuilles vertes d'environ 10 mm de long et 1 mm de large).

Aspect de feuille d'If : pinnules disposées de part et d'autres de la fronde

Taille : en général 3-6 cm Jusqu'à 19 cm



© Kyle Demes, Smithsonian Institute - CC BY-NC

Le stolon, rampant, n'est pas visible ici, il lie toutes frondes à leur base

### Perte de positions

L'algue semble perdre ses positions en méditerranée, deux hypothèses existent pour expliquer sa disparition :

- Victime d'une **dégénérescence génétique**, la caulerpe se serait exclusivement multipliée par bouturage. Il s'agirait donc d'un clone qui a pu s'appauvrir génétiquement.
- Caulerpa taxifolia a été victime de bactéries ou de virus du fait de sa structure en tube, sans cloison, où des bactéries généralement "amies" prospèrent.

### **Comment**

La Caulerpe est eurytherme c'est à dire qu'elle supporte d'important changement de température (de 6°C à 30°C), par conséquent elle est capable de s'adapter à différents climats. De plus, la caulerpe est coenocytique, elle est composée d'une unique cellule avec de nombreux noyaux, ce qui augmente sa capacité de reproduction et par conséquent sa diffusion. Les toxines qu'elle dégage la rendent moins digeste que les autres espèces de caulerpe par les gastéropodes, elle n'a donc que peu de prédateurs en Méditerranée.

### Statumenaces

La colonisation rapide de la caulerpe entraine une profonde modification des écosystèmes et conduit à une baisse de la biodiversité en homogénéisant les habitats. Cette algue menace particulièrement les herbiers de posidonie.





www.afbiodivsersite.fr



Merci à tous les experts et relecteurs pour leurs contributions

www.biolit.fr



Massif de codium photographié à marée basse en Atlantique.

Sur terre : dans la laisse de mer, soit en bord de mer, soit près des étangs littoraux. Il ne reste souvent de l'alque que des fragments desséchés et noircis.

Sous l'eau : en buissons, depuis la surface jusqu'à 10 m de profondeur.

### **Pourquoi**

Le codium fragile est originaire du Pacifique. Il serait arrivé en Méditerranée par le détroit de Gibraltar, à l'époque de la Deuxième Guerre Mondiale. Votre observation complètera la carte de répartition de cette espèce invasive sur nos côtes.


### Codium fragile - Codium fragile

Rencontre	Espèce	Statut	Plante
Peu fréquent	Invasive	Non protégée	Vivace

### **Comment**e reconnaître ?

Algue dichotomique: à chaque ramification. elle se divise en 2 parties égales

Rameaux cylindriques, de section constante sur toute leur longueur



**Consistance souple** et spongieuse

**Extrémités** arrondies

Couleur : vert foncé à vert bouteille Forme des massifs jusqu'à 50 cm de large Hauteur max = 30 cm

Sous l'eau, le couvert de poils, caractéristique des codium donne cet aspect feutré aui est à l'origine de leur nom : "codion" signifie

"petite toison"



© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

Le codium fragile est une espèce "photophile" (qui aime la lumière). Il vit dans la partie la plus éclairée de la mer, entre la surface et 10 m de profondeur, où il s'accroche par des crampons sur tous les supports : rochers, coquillages, mais aussi quais et digues. Ce codium tolère toutes les températures et salinités. De plus, il grandit vite, se multiplie facilement, et semble résistant aux pollutions : il a donc tous les atouts d'une espèce invasive.

**ALGUES VERTES** 

### **Du Pacifiqu**

Il se multiplie essentiellement par bouturage : les fragments arrachés vont se réimplanter plus loin pour former un nouveau massif. Le codium fragile se disperse ainsi rapidement. Il peut survivre longtemps, lorsqu'il est arraché, ce qui lui permet de voyager loin. Au cours du siècle dernier, il s'est ainsi peu à peu installé dans toutes les régions du monde, et même en Antarctique!

Contrairement aux autres algues, ses massifs denses procurent peu de refuge à la faune qui a besoin du couvert des algues pour se développer. Le codium est aussi peu colonisé par les animaux qui se fixent normalement sur les algues ou les posidonies. Son extension sur nos côtes semble cependant stabilisée.

BioLit est un programme de









### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

**ALGUES ROUGES** 





La grateloupe colonisant son milieu.

### la trouver ?

Elle pousse dans la partie supérieure de la zone **intertidale**. Elle colonise les cuvettes marines, se fixant sur des substrats durs, fixes ou mobiles.

### Quanta trouver?

Toute l'année. En été, les lames (ou frondes) sont plus développées. En hiver, en revanche, elles dépassent rarement 10 cm.

### Pour quoi nous intéresse-t-elle ?

La Grateloupe est une espèce à surveiller car elle a un fort caractère invasif.

On cherche à suivre la dispersion de cette espèce sur notre littoral.

Il est intéressant de noter si cette algue devient proliférante.



### Commenta reconnaître ?

Une ou plusieurs lames en forme de feuille (appelées frondes)

Lames douces et gélatineuses, typique de l'espèce



Grande algue de forme variable Texture douce et gélatineuse Couleur : rouge à brune

### **Une algue multicolore**

À l'âge adulte, la grateloupe se décolore en été et jaunit.





### **Cosmopolite**

Ayant une grande tolérance, elle s'acclimate facilement à son milieu et se disperse rapidement. Elle colonise ainsi de nouvelles régions, où elle se fixe sur les rochers, cailloux, coquillages ou sur les pontons. Elle supporte bien les eaux peu salées, et disperse facilement des spores et des individus.

### blus grande lgue rouge

La grateloupe grandit très vite : dans les zones abritées, en un été, elle peut atteindre jusque'à 2 m de long ! Sa reproduction complexe se fait en 3 étapes, comme celle de l'Asparagopsis (voir fiche Asparagopsis).

Un plant peut atteindre 40cm de long et 10cm de large en Méditerranée.

### Origine statu

Elle fait partie des espèces arrivées accidentellement au début des années 1970, avec des huîtres importées du bassin Indo-Pacifique (Japon, Corée).

Elle a été observée dans les lagunes de Thau en Méditerranée, ainsi que dans les chenaux les reliant à la mer.

BioLit est un programme de





### Rugulopteryx - Rugulopteryx okamurae

**ALGUES BRUNES** 





Sous l'eau, fixée sur les fonds rocheux peu profonds (jusqu'à 35m environ). Echouée en

épave sur le fond marin. Sur le rivage,

échouée sur les plages, notamment sur la

Quanda trouver?

développement au printemps et en été.

laisse de mer.

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Introduite et	Non protégée	Sur les côtes
localement	invasive	Non protegee	Sur les cotes

Comment la reconnaître?

**Extrémités** arrondies et tronguées

Ramifications dichotomes (se subdivisant en deux à chaque ramification)



Frondes en éventail comprimé et en groupes denses

Thalle membraneux et dressé



### Une algue très résistante

Cette alque possède une forte capacité d'adaptation. En effet, une étude a montré que les spécimens adultes avaient les mêmes taux de survie (80 à 100%), qu'ils soient soumis à des conditions d'obscurité ou d'éclairage. Il a également été démontré que cette espèce est capable d'adhérer à des surfaces de nature et de composition très diverses, augmentant ainsi sa capacité à voyager attachée aux coques des bateaux.

Son importante prolifération modifie, dans certaines zones, les paysages sous-marins et pourrait avoir des conséquences sur les

Rugulopteryx forme notamment au printemps, des tapis épais et

nauséabonds sur certaines plages ce qui pose inévitablement un

problème de gestion pour les municipalités concernées. Les pêcheurs

professionnels sont également affectés puisque cette alque engorge

Couleur: brun-vert Pas d'iridescence Taille: 5-25 cm de haut

### Pour Chaus intéresse-elle?

Présente toute l'année avec un maximum de

Originaire du Japon, cette algue introduite prolifère sur le littoral méditerranéen depuis peu. La situation est particulièrement préoccupante dans le Parc national des Calanques où elle colonise les rochers et les fonds marins, comme par exemple dans le port de Callelongue.

Vos observations de cette espèce permettront de suivre son expansion. Partagez-les dans l'Action BioLit « Les nouveaux arrivants »!

### **Voyageuse**

L'arrivée de cette alque brune sur nos côtes pourrait provenir de l'importation de naissains d'huîtres du Japon, réimplantés dans le bassin de Thau (où elle est présente depuis 2002 mais non invasive). À Marseille, l'hypothèse la plus probable est le rejet de fragments de R. okamurae, présents sur des tests d'oursins, provenant du bassin de Thau et consommés au bord de l'eau autour de l'île Maïre.

Éducalanque Parc national





www.planetemer.org

Statut et menaces

espèces indigènes.

les filets de pêche.

BioLit est un programme de

Merci à nos partenaires techniques





### Sargasse - Sargassum muticum





Rencontre Espèce Statut Lieu de vie Sur les côtes Commune Introduite Non protégée

### Comment

la reconnaître ?

Longs rameaux dressés avec nombreuses ramifications

Petits flotteurs ovales, ou "aérocystes" (Ø = 5 mm), accrochés par un pédoncule



Pseudo-feuilles dont la taille diminue du bas de l'alque vers le sommet

> Les aérocystes, remplis de gaz, maintiennent l'algue dressée

Identifiable à sa grande taille : 2 à 12 m ! Forme générale : long rameau terminé en pointe Couleur : jaune verdâtre à brune

a trouver ?

Elle se rencontre en Méditerranée, en

substrats durs, jusqu'à 30 et 40m et dans

En période estivale. En hiver, les grands

rameaux se désagrègent. Il ne reste que la base (<10 cm) de cette algue

annuelle.

mode battu ou semi-battu sur des

des cuvettes de l'étage infra-littoral.

On cherche à recenser l'importance de la colonisation de cette nouvelle venue, en notant, pour chaque zone, la densité de ses peuplements.

### Une algue qui n'est pas difficile

La sargasse préfère les zones sableuses où elle se fixe sur tout objet dur : pierre, coquillage, etc. Mais elle s'accroche aussi sur les fonds rocheux avec ses solides crampons.



La sargasse grandit vite, jusqu'à 10 cm par jour!

Elle crée d'impressionnantes cathédrales sousmarines



© Yann Fontana / Station Biologique de Roscoff

La sargasse comprend deux parties à durée de vie différente : - La base est pérenne. Elle forme un disque, surmonté de quelques axes très courts (5 cm), qui est maintenu sur le fond par des crampons. C'est tout ce qu'il reste de l'algue en hiver.

- La partie supérieure est annuelle. Elle se développe au printemps en longs faisceaux très ramifiés. La sargasse a été introduite accidentellement vers 1975 avec des huîtres provenant du Japon. Elle tolère toutes les températures (- 9° et + 30°C), grandit vite et se reproduit avec succès. Elle n'a donc pas eu de difficulté à s'acclimater aux eaux européennes où elle s'est répandue rapidement.

Elle appartient à la famille des fameuses algues flottantes de

Mer des Sargasses (au large des Bermudes) qui causèrent tant de problèmes aux navires de Christophe Colomb en route vers le Nouveau Monde.

La sargasse a colonisé tout le littoral européen, du Portugal jusqu'à la Norvège! On pense, aujourd'hui, que sa prolifération est stabilisée. Ne pouvant lutter contre son invasion, on pense à l'exploiter commercialement.

BioLit est un programme de



partenaires techniques





### www.biolit.fr

### Wakamé - Undaria pinnatifida

### **ALGUES BRUNES**



e rain ronala, station prorgique de roscon	

Le Wakamé est une grande alque souple aui peut former des forêts denses.

### e trouver ?

Sur terre : dans les dépôts de la laisse de mer, souvent un seul lobe de l'alque déchirée. Sous l'eau: à faible profondeur (0 à 2 m), dans les endroits rocheux.

### trouver ?

De l'automne jusqu'au début de l'été, car cette alque annuelle dépérit ensuite.

Espèce d'origine japonaise, le Wakamé a été introduit de façon accidentelle dans l'étang de Thau, vers 1970, avec des huîtres japonaises mises en culture. Il y a proliféré et se propage dans le golfe du Lion, via les canaux qui relient l'étang à la mer. Votre observation permettra de suivre la colonisation.

Statut Lieu de vie Rencontre Espèce Rare Introduite Non protégée Sur les côtes

### **Comment**e reconnaître ?

Fronde découpée en grandes lanières

Une nervure médiane nette

**Grande alque souple** en forme de feuille très lobée Souvent on ne trouve qu'une lanière arrachée à l'alque



Couleur: brun-jaunâtre Taille = 60 à 130 cm

Le Wakamé change de forme au cours de sa vie : Jeune algue : forme de feuille allongée, non découpée. Alque mature : - fronde large et découpée en grandes lanières,

- structures plissées, plus ou moins importantes.

### Chez les algues, on ne parle pas :

- de feuille mais de fronde.
- de tige mais de stipe.
- de racines mais de crampons.

Structures plissées à la base, plus ou moins développées

### Une algueres tolérante

C'est une alque d'eau tempérée qui préfère les endroits éclairés et calmes. Très tolérante, elle supporte l'eau saumâtre comme l'eau de mer. Elle se fixe sur tout ce qu'elle trouve : rocher, coque de bateau, dique,... et forme des forêts denses.

Les structures festonnées qui entourent la base sont les parties reproductrices. Elles libèrent les spores qui vont donner des cellules sexuelles. Celles-ci se féconderont dans l'eau et donneront naissance à une nouvelle plantule.

### des gourmets

Le Wakamé est largement cultivé au Japon et en Corée (500 000 tonnes/an) où il entre dans la confection des salades et soupes. Il a été introduit en Bretagne à la fin du XXème siècle pour répondre aux besoins des restaurants japonais d'Europe.

Cette algue s'est installée dans de nombreux autres pays (Australie, Nouvelle Zélande, Mexique, Argentine, Californie...) où elle est arrivée, soit fixée aux coques des navires, soit avec les cultures d'huîtres japonaises. Elle y pousse en forêts denses qui occultent la lumière et entrent en compétition avec les espèces locales.



Ces 3 stades du développement du Wakamé ont été trouvés dans l'étang de Thau (Hérault).

BioLit est un programme de









### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr



Une dizaine d'ascidies massue accrochées à une corde, dans un port.

Elle est commune sur les zones sublittorales, jusqu'à 25m de profondeur. On la retrouve souvent en tant que salissure marine sur les infrastructures artificielles, surtout celles immergées.

### Quanda trouver?

Toute l'année.

### Pourquoi nous intéresse-t-elle?

Cette espèce a été introduite accidentellement, et prolifère en Méditerranée sans prédateurs. L'ascidie est parfois très abondante dans les ports, où elle peut occasionner des gênes importantes.

Vos observations permettront de suivre son évolution et sa répartition.

### Ascidie massue – Styela clava

ou ascidie plissée



Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Fréquente	Introduite	Espèce invasive	Sur les côtes

### Commenta reconnaître ?

Les 2 siphons sont typiques des ascidies :

Sommet couvert de bosses



L'eau ressort par le siphon cloacal (l'anus)




Schéma de la structure interne d'une ascidie.

Corps plissé Pédoncule fixateur

Formée d'une partie renflée (= l'animal) et d'un pédoncule Surface extérieure (tunique) ferme comme du cuir Couleur : brune, marbrée de blanc Taille totale max = 18 cm

### **Comment**<sub>vit-elle</sub>?

L'ascidie est un animal filtreur. L'eau entre par le siphon buccal. Elle est filtrée par les branchies qui tapissent l'intérieur puis expulsée par le siphon cloacal. Au passage, les branchies prélèvent l'oxygène et retiennent les microorganismes. Ceux-ci sont ensuite digérés dans l'estomac. Les résidus sont évacués par l'intestin.

### Le plus évolué des invertébrés

Malgré son air primitif, l'ascidie est plus proche de nous que le poulpe ou le crabe! Sa larve, semblable à un têtard avec sa longue queue, possède en effet une "chorde", ancêtre de la colonne vertébrale. Mais dès que la larve se fixe sur le fond, elle se métamorphose: ses organes sensoriels et sa queue disparaissent, des branchies apparaissent, et elle prend la forme d'une outre munie de 2 siphons.

### Statutet menaces

L'ascidie massue est originaire du Pacifique nord-ouest. Elle est arrivée en Angleterre dans les années 1950, accrochée à la coque de bateaux revenant de Corée. Depuis, elle s'est répandue sur les côtes européennes, de la mer du Nord à la Méditerranée, car elle tolère des températures de -2° à +25°C! Lorsqu'elle pullule (jusqu'à 1000/m2), elle entre en compétition avec les coquillages qui filtrent aussi le plancton\*.

\*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de



### BioLit Les observateurs du littoral www.biolit.fr

### Ascidie plissée – Styela plicata



### TUNICIER



Vue sur les deux siphons.

Sur des substrats durs, à faible profondeur, presque exclusivement dans les sites portuaires et les lagunes. Elle se fixe partout : sur les coquillages, les algues, mais aussi les bateaux, les digues et pontons.

### Quanda trouver?

Toute l'année.

### Pourquoi nous intéresse-t-elle :

C'est une espèce invasive originaire du Pacifique Nord-Ouest.

Elle est présente depuis longtemps en Méditerranée (dans le port de Marseille et l'étang de Thau par exemple), et a été observée dans le golfe de Gascogne.

Bien que ce ne soit pas une espèce commune, vos observations permettront de suivre son évolution et sa répartition.

Rencontre	Espèce	Statut	Lieu de vie
Rare	Introduite	Espèce invasive	Sur les côtes

### **Comment** reconnaître?

4 lignes doubles

brunâtres

Les 2 siphons sont typiques des ascidies :

L'eau entre par le siphon buccal (la bouche)

L'eau ressort par le siphon cloacal (l'anus)




Schéma de la structure interne d'une ascidie.

Taille : de 5 à 10 cm Couleur : beige à brun

L'ascidie plissée est solitaire, mais vit souvent fixée en groupes.





### Comment<sub>it-elle?</sub>

L'ascidie est un animal filtreur. L'eau entre par le siphon buccal. Elle est filtrée par les branchies qui tapissent l'intérieur puis expulsée par le siphon cloacal. Au passage, les branchies prélèvent l'oxygène et retiennent les micro-organismes. Ceuxci sont ensuite digérés dans l'estomac. Les résidus sont évacués par l'intestin.

### Le plus évolue des invertébrés

Malgré son air primitif, l'ascidie est plus proche de nous que le poulpe ou le crabe! Sa larve, semblable à un têtard avec sa longue queue, possède en effet une "chorde", ancêtre de la colonne vertébrale. Mais dès que la larve se fixe sur le fond, elle se métamorphose: ses organes sensoriels et sa queue disparaissent, des branchies apparaissent, et elle prend la forme d'une outre munie de 2 siphons.

### À ne pas on fondre avec

Styela canopus que l'on rencontre plus profondément, souvent sur des zones d'éboulis.

Styela clava, l'ascidie japonaise, qui est une espèce invasive reconnaissable à sa forme pédonculée et à ses siphons rayés de pourpre.

BioLit est un programme de